

J_Karakterisasi Beberapa Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim Tripsin

by Das Salirawati

Submission date: 28-Apr-2020 07:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 1309666005

File name: terisasi_Beberapa_Ion_Logam_terhadap_Aktivitas_Enzim_Tripsin.pdf (361.61K)

Word count: 3784

Character count: 23224

8
**KARAKTERISASI BEBERAPA ION LOGAM
TERHADAP AKTIVITAS ENZIM TRIP SIN**

**(THE CHARACTERIZATION OF SEVERAL METAL IONS
TOWARDS THE ENZYME TRYP SIN ACTIVITY)**

Eddy Sulistyowati, Das Salirawati, dan Amanatie

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta

e-mail: eddy_sulistyowati@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum enzim tripsin dan mengetahui pengaruh penambahan ion logam Ag^+ (dalam bentuk senyawa AgNO_3), ion logam Cu^{2+} (dalam bentuk senyawa CuCl_2), ion logam K^+ (dalam bentuk senyawa KHPO_4), dan ion logam Zn^{2+} (dalam bentuk senyawa ZnSO_4) dalam berbagai variasi konsentrasi terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein. Aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein ditentukan dengan metode Anson pada kondisi optimum. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein 10 mg/mL pada kondisi optimum pada pH 8,37°C, waktu inkubasi 20 menit dengan penambahan ion logam (Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , K^+) pada berbagai variasi konsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian terbukti secara empiris adanya kecenderungan ion logam Ag^+ dan Cu^{2+} bersifat inhibitor dan ion logam Zn^{2+} dan K^+ bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin pada substrat kasein.

Kata kunci: ion logam, kasein, tripsin, aktivator, inhibitor

34
Abstract

This study was aimed at determining the optimal conditions of the trypsin enzyme and the effect of metal ion Ag^+ (in the form of AgNO_3), metal ion Cu^{2+} (in the form of CuCl_2), K^+ metal ions (in the form of KHPO_4), and ion Metal Zn^{2+} (in the form of ZnSO_4) in various concentrations towards trypsin enzyme activity using casein substrate. The activity of trypsin enzyme was determined by Anson method in optimum conditions. The data were analyzed using qualitative descriptive. The results show that the activity of trypsin enzyme with substrate casein 10mg/mL in pH 8.37°C, incubation time of 20 minutes with the additional of ion (Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , K^+) at various concentrations. Based on the research results, it was empirically proven that they were tendency of Ag^+ dan Cu^{2+} to act as inhibitors and metal ions Zn^{2+} and K^+ to act as activators to trypsin enzyme activity at casein substrat.

Keywords: metal ions, casein, trypsin, activators, inhibitors

PENDAHULUAN

Enzim merupakan kelompok protein yang bersifat katalis dan mengatur perubahan senyawa kimia dalam sistem biologis. Enzim dapat dihasilkan oleh hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Secara katalitik, enzim menjalankan fungsinya dalam berbagai reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer gugus, dan kadang-kadang pemutusan rantai karbon (Sumardjo, 2006). Enzim telah banyak digunakan dalam berbagai proses kimiawi, baik dalam bidang industri maupun dalam bidang bioteknologi. Seiring dengan peningkatan penggunaan enzim, berbagai eksplorasi penelitian tentang enzim telah banyak dilakukan (Falch, 1991).

Enzim tripsin merupakan salah satu enzim yang termasuk dalam golongan enzim proteolitik atau protease serin. Enzim ini mengkatalisis reaksi pemecahan protein dengan menghidrolisis ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Tripsin dalam tubuh diproduksi di dalam pankreas. Situmorang (2014) memaparkan aktivitas enzim dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Pengaruh aktivator, inhibitor, dan kofaktor dalam beberapa keadaan juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Bailey dan Ollis (1988) menjelaskan salah satu karakteristik aktivitas enzim

adalah memerlukan kofaktor, yaitu gugus non protein dari enzim yang menentukan aktivitas katalitiknya. Kofaktor dapat berupa koenzim yang tidak terikat kuat dalam enzim yang biasanya berupa molekul organik, dan gugus prostetik yang terikat kuat dalam enzim yang biasanya berupa molekul anorganik (ion-ion logam), seperti ion logam Fe^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} dan Ca^{2+} (Lehninger, 1997).

Senyawa kofaktor yang berupa ion logam ada yang berpotensi meningkatkan aktivitas kerja suatu enzim yang disebut sebagai aktivator enzim, ada pula ion logam yang menghambat aktivitas enzim disebut inhibitor enzim (Sumardjo, 2006). Kemampuan logam tertentu untuk berikatan dengan banyak ligan dalam bidang koordinasi logam menyebabkan logam dapat ikut serta dalam pengikatan substrat atau koenzim ke enzim dan menimbulkan polarisasi gugus reaktif di tempat aktif. Ion logam dapat mendukung efisiensi katalitik enzim. Ion logam dapat membantu reaksi katalitik dengan cara mengikat substrat pada sisi pemotongan. Selain berperan dalam pengikatan enzim dengan substrat, beberapa ion logam juga dapat mengikat enzim secara langsung untuk menstabilkan konformasi aktifnya atau menginduksi formasi situs pengikatan atau situs aktif suatu enzim (Baehaki, Rinto, & Budiman, 2011).

Inhibitor adalah senyawa yang menurunkan kecepatan reaksi enzimatik. Berdasarkan sifat kinetiknya inhibitor dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu inhibitor kompetitif, nonkompetitif *reversible* dan nonkompetitif *irreversible*. Sedangkan suatu senyawa, unsur atau ion yang dapat meningkatkan aktivitas kerja suatu enzim disebut aktivator enzim. Kebanyakan aktivator adalah ion-ion anorganik, terutama ion logam atau kation. Ion-ion logam ini umumnya ditambahkan dalam bentuk garam, misalnya ion Ca^{2+} dalam bentuk garam klorida. Kation-kation lain yang telah diketahui dapat mengaktifkan enzim adalah Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+ , Mg^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , dan Al^{3+} .

Soda dan Agustini (2013) mengatakan bahwa peningkatan aktivitas enzim papain dapat terjadi, karena ikatan yang terbentuk antara enzim dan ion logam K^+ atau antara substrat dan ion logam K^+ tidak terlalu kuat sehingga tidak menyebabkan perubahan konformasi enzim. Penambahan ion logam dengan konsentrasi optimum akan meningkatkan konsentrasi kompleks logam substrat kasein, kemudian membuat kesetimbangan pada daerah yang diinginkan dan mengubah potensial elektrokinetik enzim, sehingga proses aktivasi dapat terjadi dengan optimal.

Penelitian Green dan Neurath (1953) menunjukkan bahwa keberadaan ion Ca^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} , dan Mn^{2+} dapat meningkatkan

aktivitas tripsin maksimal sebesar 25%, sebaliknya keberadaan ion Cu^{2+} , Hg^{2+} dan Ag^+ menjadi penghambat aktivitas dengan substrat benzoil-n-arginin etil ester (BAEE), benzoil-n-argininamide (BAA), dan asetil-L-tirosin etil ester (ATEE). Dengan demikian berarti penambahan ion logam dalam bentuk senyawa kimia dapat mempengaruhi aktivitas enzim proteolitik.

Pada penelitian ini telah ditambahkan ion logam Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , dan K^+ dalam bentuk senyawa AgNO_3 , CuCl_2 , ZnSO_4 , dan KHPO_4 sebagai kofaktor untuk diketahui secara empiris pengaruh ion-ion logam tersebut terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein dalam berbagai konsentrasi pada kondisi optimum. Berdasarkan penelitian ini dapat ditentukan kondisi optimum aktivitas enzim tripsin meliputi pH, suhu, dan waktu inkubasi dan karakterisasi dari ion-ion logam yang ditambahkan termasuk aktivator atau inhibitor terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein.

Zhang, Zhang, Liu, Gao, & Liu (2014) menyatakan bahwa sifat aktivator ion Zn^{2+} relatif tidak terlalu tinggi meningkatkan aktivitas enzim tripsin, dalam artian kenaikan aktivitasnya tidak melebihi aktivitas optimum enzim tripsin yang tanpa penambahan ion logam (0,00336), meskipun untuk aktivitas tertinggi menurut hasil penelitian ini (0,0007). Lebih lanjut

dijelaskan bahwa ion logam Zn^{2+} hanya mampu sedikit mengubah struktur sekunder enzim tripsin, sehingga aktivitas enzim tersebut relatif stabil.

Penelitian ini sangat penting dilakukan, karena dapat menjadi dasar acuan bagi proses industri yang menggunakan enzim tripsin tentang kegunaan dan dampak dari ion-ion logam tersebut terhadap aktivitas enzim tripsin. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan cara mengantisipasi jika seseorang keracunan ion-ion logam tersebut dalam saluran pencernaannya. Hasil penelitian ini juga penting sebagai referensi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan ion-ion logam yang lain terhadap aktivitas enzim-enzim yang lain yang ada dalam tubuh kita sehingga dengan mengetahui pengaruh keberadaan ion-ion logam tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengantisipasi dengan tepat jika ion logam tersebut masuk ke dalam tubuh.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis eksperimen laboratorium dengan subjek penelitian enzim tripsin, sedangkan objeknya adalah aktivitas enzim tripsin pada penambahan beberapa ion logam dalam bentuk senyawa kimia dengan berbagai konsentrasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ion logam dalam bentuk senyawa yang ditambahkan

pada penentuan aktivitas enzim tripsin, sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas enzim tripsin pada penambahan ion logam dalam bentuk senyawa dalam berbagai konsentrasi. Variabel terkendali dari penelitian ini adalah kondisi optimum dari enzim tripsin meliputi pH, suhu, dan waktu inkubasi.

Penelitian diawali dengan penentuan kondisi optimum aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein yang meliputi pH, suhu, waktu inkubasi. Pada penentuan pH dengan menggunakan metode Anson, dilakukan dengan menentukan absorbansi larutan sampel, larutan kontrol, dan larutan blanko pada panjang gelombang maksimum (650 nm) yang sebelumnya telah ditentukan. Adapun variasi pH yang dilakukan berturut-turut 7; 7,5; 8; 8,5; dan 9 pada tabung reaksi. Prosedur ini dilakukan sebanyak tiga kali (triplo).

Penentuan suhu dan waktu inkubasi dilakukan dengan prosedur yang sama, hanya ketika menentukan suhu optimum berarti pH optimum dan waktu inkubasi yang digunakan tetap. Demikian juga ketika menentukan waktu inkubasi optimum, maka dilakukan pada pH dan suhu optimum yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir dilakukan penentuan aktivitas enzim tripsin pada kondisi optimum dengan prosedur yang sama pula. Penentuan ini dilakukan pada pH, suhu, dan waktu inkubasi optimum

yang telah diperoleh pada prosedur sebelumnya. Langkah selanjutnya dilakukan penentuan aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein pada kondisi optimum (pH, suhu, waktu inkubasi) dengan penambahan beberapa ion logam dalam bentuk senyawa menggunakan metode Anson. Prosedur yang dilakukan sama dengan ketika penentuan kondisi optimum, hanya pada langkah setelah enzim tripsin dimasukkan diikuti dengan penambahan ion logam dengan konsentrasi bervariasi pada larutan sampel dan kontrol, sedangkan pada larutan blangko ion logam ditambahkan setelah memasukkan buffer fosfat. Pada penelitian ini ion logam yang ditambahkan adalah ion Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , dan K^+ dalam bentuk senyawa AgNO_3 , CuCl_2 , ZnSO_4 , dan KHPO_4 .

Setelah diperoleh absorbansi aktivitas enzim tripsin terhadap substrat kasein dengan berbagai penambahan ion-ion logam dalam bentuk senyawa pada berbagai variasi, maka akan diperoleh data absorbansi yang kemudian dihitung aktivitasnya. Selanjutnya dilakukan karakterisasi masing-masing ion logam dengan cara membuat grafik hubungan penambahan ion logam tersebut terhadap aktivitas enzim tripsin pada kondisi optimum dibandingkan dengan aktivitas enzim tripsin tanpa penambahan ion logam pada kondisi optimum. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim, termasuk aktivator

yang meningkatkan aktivitas enzim tripsin ataukah inhibitor yang menurunkan aktivitas enzim tripsin.

³²**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh penambahan ion-ion logam Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , dan K^+ dalam bentuk senyawa AgNO_3 , CuCl_2 , ZnSO_4 , dan KHPO_4 , sebagai kofaktor terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein dalam berbagai konsentrasi pada kondisi optimum.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini mula-mula akan ditentukan aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein menggunakan metode Anson pada kondisi optimum (pH, suhu, waktu inkubasi) yang ditentukan. Kemudian dilakukan penentuan aktivitas enzim tripsin (substrat kasein) dengan penambahan ion-ion tersebut menggunakan tiga tabung, yaitu tabung T (sampel), tabung B (blangko), dan tabung T_0 (kontrol). Analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membuat grafik hubungan penambahan ion dalam bentuk senyawa terhadap aktivitas enzim tripsin pada kondisi optimum dibandingkan dengan aktivitas enzim tripsin tanpa penambahan ion dalam bentuk senyawa pada kondisi optimum, kemudian dideskripsikan pengaruh masing-masing ion terhadap aktivitas enzim tripsin.

Penentuan pH optimum dilakukan pada suhu 35°C, waktu inkubasi 20 menit, dan variasi pH yang digunakan adalah 7, 8, dan 9. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan sampel dan kontrol, maka aktivitas enzim tripsin yang diperoleh pada pH 7, 8, dan 9 berturut-turut sebesar 0,0026; 0,0051; dan 0,0032 unit aktivitas enzim. Dengan demikian pH optimum berada pada pH 8.

Penentuan suhu optimum dilakukan pada pH optimum (pH 8), waktu inkubasi 20 menit, dan variasi suhu yang digunakan 31, 33, 35, 37, dan 39°C. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan sampel dan kontrol, maka aktivitas enzim tripsin yang diperoleh pada suhu 31, 33, 35, 37, dan 39°C berturut-turut sebesar 0,00185; 0,00405; 0,00435; 0,00505; dan 0,00340 unit aktivitas enzim. Dengan demikian suhu optimum berada pada suhu 37°C.

Penentuan waktu inkubasi optimum dilakukan pada pH optimum (pH 8), suhu optimum (37°C), dan variasi waktu inkubasi yang digunakan 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan sampel dan kontrol, maka aktivitas enzim tripsin yang diperoleh pada waktu inkubasi 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit berturut-turut sebesar 0,00210; 0,00300; 0,00425; 0,00225; dan 0,00170 unit aktivitas enzim. Dengan demikian waktu inkubasi optimum berada pada waktu inkubasi 20 menit.

Penentuan konsentrasi substrat (kasein) optimum dilakukan pada pH optimum (pH 8), suhu optimum (37°C), dan waktu inkubasi optimum (20 menit). Adapun variasi konsentrasi substrat (kasein) berturut-turut 2 mg/mL; 4 mg/mL; 6 mg/mL; 8 mg/mL; dan 10 mg/mL. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan sampel dan kontrol, maka aktivitas enzim tripsin yang diperoleh pada konsentrasi substrat (kasein) 2 mg/mL; 4 mg/mL; 6 mg/mL; 8 mg/mL; dan 10 mg/mL berturut-turut sebesar 0,00085; 0,00150; 0,00210; 0,00310; dan 0,00350 unit aktivitas enzim. Dengan demikian konsentrasi substrat (kasein) optimum berada pada konsentrasi 10 mg/mL.

Penentuan konsentrasi substrat (kasein) optimum dilakukan pada pH optimum (pH 8), suhu optimum (37°C), waktu inkubasi optimum (20 menit), dan konsentrasi substrat (kasein) optimum 10 mg/mL. Adapun volum enzim tripsin yang digunakan sebesar 1,5 mL. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan sampel dan kontrol secara pentaplo (lima kali pengukuran), maka aktivitas enzim tripsin yang diperoleh rerata 0.00336 unit aktivitas enzim.

Prosedur yang dilakukan dalam menentukan aktivitas enzim tripsin terhadap penambahan ion logam Ag⁺ (dalam bentuk senyawa AgNO₃) pada kondisi optimum, yaitu pH 8, suhu 37°C, waktu inkubasi 20 menit, dan konsentrasi substrat (kasein)


10 mg/mL sama dengan prosedur yang dilakukan pada penentuan aktivitas enzim tripsin. Perbedaannya 0,5 mL larutan buffer fosfatnya diganti dengan larutan AgNO_3 dengan berbagai konsentrasi, yaitu 0,002 M; 0,004 M; 0,006 M; dan 0,008 M. Hasil pengukuran larutan sampel dan kontrol pada konsentrasi tersebut berturut-turut sebesar 0,00085; 0,00025; 0,00075; dan 0,00010 unit aktivitas enzim. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 tampak bahwa pada penambahan ion logam Ag^+ terjadi fluktuasi aktivitas enzim tripsin yang semula turun kembali naik dan kemudian turun lagi. Namun kenaikan aktivitas enzim tripsin yang terjadi, baik pada penambahan

konsentrasi ion logam Ag^+ sebesar 0,002 M (0,00085) maupun 0,006 M (0,00075) masih berada di bawah aktivitas enzim tripsin tanpa penambahan ion logam konsentrasi (0,00336).



Berdasarkan penelitian Green dan Neurath (1953), keberadaan ion Ag^+ menjadi penghambat aktivitas dengan substrat benzoil-n-arginin etil ester (BAEE), benzoil-n-argininamide (BAA), dan asetil-L-tirosin etil ester (ATEE). Ion logam Ag^+ merupakan *inhibitor nonkompetitif reversible* yang mempunyai sifat dapat berikatan dengan enzim bebas (E) ataupun kompleks enzim (ES), maka sifat kereversibelannya membuat ion Ag^+ dapat mengganggu aktivitas enzim dalam

Gambar 1. Hubungan antara Konsentrasi ion Ag^+ (dalam Bentuk Senyawa AgNO_3) dengan Aktivitas Enzim Tripsin




menghasilkan produk, tetapi dapat pula membiarkan enzim berikatan bebas dengan substrat hingga menghasilkan produk. Hal ini karena *inhibitor nonkompetitif* memiliki tempat yang berbeda dari sisi aktif enzim, sehingga tidak bersifat memblokir substrat untuk tidak berikatan dengan enzim.

Reaksi yang terjadi antara substrat dengan inhibitor nonkompetitif dalam bersaing dengan substrat untuk menempati tempatnya masing-masing dari enzim dapat dituliskan:



Dengan prosedur yang sama seperti yang dilakukan ketika penambahan ion logam Ag^+ , hanya berbeda jenis ion logam yang ditambahkan, yaitu ion Cu^{2+} (dalam bentuk senyawa $CuCl_2$) dengan variasi konsentrasi 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,01 M. Hasil pengukuran larutan sampel dan kontrol pada konsentrasi tersebut berturut-turut sebesar 0,00138; 0,00118; 0,0011; 0,00233; dan 0,0011 unit aktivitas enzim. Hasil tersebut dapat disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa ion logam Cu^{2+} bersifat inhibitor terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein. Hal ini sesuai dengan penelitian Green dan Neurath (1953), keberadaan ion



Cu^{2+} menjadi penghambat aktivitas dengan substrat benzoil-n-arginin etil ester (BAEE), benzoil-n-argininamide (BAA), dan asetil-L-tirosin etil ester (ATEE). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Zufahair, Ningsih, dan Habibah (2014) yang berhasil menunjukkan bahwa ion logam Cu^{2+} mampu menurunkan aktivitas enzim papain baik yang diisolasi dari daun pepaya kalifornia maupun Bangkok. Hal ini menunjukkan ion Cu^{2+} bertindak sebagai inhibitor bagi enzim papain dari daun pepaya kalifornia dan Bangkok.

Senyawa inhibitor merupakan senyawa yang dapat mengubah kemampuan enzim dalam mengikat substrat sehingga menyebabkan perubahan daya katalisator enzim. Perubahan ini disebabkan oleh ion logam Cu^{2+} berikatan dengan sisi aktif enzim atau ion tersebut menggantikan logam yang berada pada sisi aktif, sehingga struktur enzim berubah sedemikian rupa. Perubahan ini mengakibatkan konformasi enzim menjadi tidak efektif dalam mengikat substrat dan akhirnya membuat aktivitas katalitiknya menurun. Ion logam Cu^{2+} dalam papain kalifornia memiliki aktivitas yang sangat rendah diduga karena ikatan enzim dengan ion tersebut mengakibatkan konformasi sisi aktif enzim menjadi sangat tidak sesuai untuk berikatan dengan substrat.


Dilihat dari grafik menunjukkan pada konsentrasi ion logam Cu^{2+} aktivitas enzim

tripsin mengalami kenaikan relatif tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena sifat inhibitor ion logam Cu^{2+} yang berikatan lemah dengan enzim, sehingga suatu saat mudah lepas dan digantikan oleh substrat, sehingga aktivitas enzim meningkat yang ditunjukkan dengan terbentuknya produk yang besar. Namun kenaikan aktivitas enzim tripsin yang terjadi, pada penambahan konsentrasi ion logam Cu^{2+} sebesar 0,008 M (0,00233) masih berada di bawah aktivitas enzim tripsin tanpa penambahan ion logam konsentrasi (0.00336).

Dengan prosedur yang sama seperti yang dilakukan ketika penambahan ion logam Ag^+ , hanya berbeda jenis ion logam yang ditambahkan, yaitu ion logam Zn^{2+} (dalam bentuk senyawa ZnSO_4) dengan variasi konsentrasi 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,01 M. Hasil pengukuran larutan sampel dan kontrol pada konsentrasi tersebut berturut-turut sebesar 0,0001; 0,00025; 0,0007; 0,000225; dan 0,000575 unit aktivitas enzim. Hasil tersebut dapat disajikan dengan grafik yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan pada penambahan ion logam Zn^{2+} sebanyak 0,008 M terjadi penurunan aktivitas enzim tripsin. Hal ini disebabkan ion logam yang bertindak sebagai aktivator ikatannya dengan enzim lemah, sehingga reaksinya bersifat *reversible* dan akan menghasilkan produk yang melimpah,

Gambar 3. Hubungan antara Konsentrasi ion Zn^{2+} (dalam Bentuk Senyawa $ZnSO_4$) dengan Aktivitas Enzim Tripsin



begitu pula sebaliknya. Ion logam Zn^{2+} bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein. Kebanyakan aktivator adalah ion-ion anorganik, terutama ion logam atau kation. Ion-ion logam ini umumnya ditambahkan dalam bentuk garam, misalnya ion Zn^{2+} dalam bentuk garam klorida atau garam sulfat. Hal ini sesuai dengan penelitian Kamelia, Muliawati, dan Dessy (2005) yang menunjukkan ion Zn^{2+} dapat meningkatkan aktivitas enzim papain, dengan nilai aktivitas relatif sebesar 123,200% untuk daun pepaya kalifornia dan 131,673% untuk daun pepaya bangkok. Lebih lanjut dinyatakan bahwa peran Zn^{2+} dalam mengaktivasi reaksi hidrolisis protein didasarkan pada kemampuannya dalam membentuk ikatan kovalen koordinasi

dengan residu asam amino dari protease dan bersifat sebagai akseptor elektron, sehingga mampu berinteraksi dengan basa, yaitu gugus OH^- dari molekul air. Ion logam Zn^{2+} diduga akan mempolarisasi gugus karbonil substrat kasein dan memfasilitasi deprotonisasi molekul air, sehingga mempermudah reaksi hidrolisis.

Dengan prosedur yang sama seperti yang dilakukan ketika penambahan ion logam Ag^+ , hanya berbeda jenis ion logam yang ditambahkan, yaitu ion logam K^+ (dalam bentuk senyawa $KHPO_4$) dengan variasi konsentrasi 0,002 M; 0,004 M; 0,006 M; 0,008 M; dan 0,01 M. Hasil pengukuran larutan sampel dan kontrol pada konsentrasi tersebut berturut-turut sebesar 0,002867; 0,004233; 0,004533; 0,003; dan 0,0047

unit aktivitas enzim. Hasil tersebut dapat disajikan dengan grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.


Berdasarkan grafik pada Gambar 4 menunjukkan pada penambahan ion logam K^+ sebanyak 0,008 M terjadi penurunan aktivitas enzim tripsin. Hal ini disebabkan ion logam yang bertindak sebagai aktivator ikatannya dengan enzim lemah, sehingga reaksinya bersifat *reversible* dan akan menghasilkan produk yang melimpah, begitu pula sebaliknya.

Ion logam K^+ bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein. Kebanyakan aktivator adalah ion-ion anorganik, terutama ion logam atau kation. Ion-ion logam ini umumnya ditambahkan

dalam bentuk garam, misalnya ion K^+ dalam bentuk garam fosfat. Hal ini sesuai dengan penelitian Soda dan Agustini (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas enzim papain dapat terjadi, karena ikatan yang terbentuk antara enzim dan ion logam K^+ atau antara substrat dan ion logam K^+ tidak terlalu kuat, sehingga tidak menyebabkan perubahan konformasi enzim.

Penambahan ion logam dengan konsentrasi optimum akan meningkatkan konsentrasi kompleks logam substrat kasein, kemudian membuat kesetimbangan pada daerah yang diinginkan dan mengubah potensial elektrokinetik enzim, sehingga proses aktivasi dapat terjadi dengan optimal. Pada penelitian ini tidak dilakukan

Gambar 4. Hubungan antara Konsentrasi ion K^+ (dalam Bentuk Senyawa $KHPO_4$) dengan Aktivitas Enzim Tripsin



penambahan ion logam pada konsentrasi optimum, sehingga aktivitas enzim yang terjadi tidak optimal pula.

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris adanya kecenderungan ion logam Ag^+ dan Cu^{2+} bersifat inhibitor dan ion logam Zn^{2+} dan K^+ bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin pada substrat kasein. Kenaikan aktivitas enzim tripsin yang terjadi pada penambahan keempat ion logam tersebut (Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , dan K^+) masih berada di bawah aktivitas enzim tripsin tanpa penambahan ion logam konsentrasi (0.00336).

4 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum aktivitas enzim tripsin dengan substrat kasein sebanyak 10 mg/mL, yaitu berada pada pH 7, suhu 37°C, dan waktu inkubasi 20 menit. Ada pengaruh penambahan ion logam Ag^+ (dalam bentuk senyawa AgNO_3), ion logam Cu^{2+} (dalam bentuk senyawa CuCl_2), ion logam K^+ (dalam bentuk senyawa KHPO_4), dan ion logam Zn^{2+} (dalam bentuk senyawa ZnSO_4) dalam berbagai variasi konsentrasi terhadap aktivitas enzim tripsin. Hasil secara empiris menunjukkan kecenderungan ion logam Ag^+ dan Cu^{2+} bersifat inhibitor dan ion logam

Zn^{2+} dan K^+ bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin pada substrat kasein.

DAFTAR PUSTAKA

- 11 Baehaki, A., Rinto, & Budiman, A. (2011). Isolasi dan karakterisasi protease dari bakteri Tanah Rawa Indralaya, Sumatera Selatan. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 22(1), 37-42.
- Bailey, J. E., & Ollis, D. F. (1988). *Biochemical engineering fundamental* (2nd ed.). New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- 24 Falch, E. A. (1991). Industrial enzymes - developments in production and application. *Biotechnology advances*, 9(4), 643-658.
- 17 Green, N. M., & Neurath, H. (1953). The effects of divalent cations on trypsin. *Journal of Biological Chemistry*, 204(1), 379-390.
- 15 Kamelia, R., Muliawati, S., & Dessy, N. (2005). Isolasi dan karakterisasi protease intraselular termotabil dari bakteri *Bacillus stearothermophilus* RP1. *Prosiding Seminar Nasional MIPA*. Departemen Kimia ITB, Bandung.
- 1 Lehninger, A. L. (1997). *Dasar-dasar biokimia* Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- 21 Situmorang, N. (2014). *Aktivitas protease dan uji fisiologi isolat bakteri proteolitik dari limbah cair nanas* (Skripsi tidak Dipublikasikan). FMIPA Universitas Lampung, Lampung.
- 7 Soda, F. N., & Agustini, R. (2013). Pengaruh penambahan ion logam K^+ terhadap

aktivitas enzim papain. *UNESA Journal of Chemistry*, 2(2), 29-34.

²³ Sumardjo, D. (2006). *Pengantar kimia*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

⁶ Zhang, T., Zhang, H., Liu, G., Gao, C., & Liu, R. (2014). Interaction of Cu²⁺,

Pb²⁺, Zn²⁺ with trypsin: What is the key factor of their toxicity?. *Journal of fluorescence*, 24(6), 1803-1810.

¹⁴ Zufahair, Ningsih, D. R., & Habibah, F. N. (2014). Karakterisasi papain dari daun pepaya (*Carica Papaya L.*). *Molekul*, 9(1), 44-55.

J_Karakterisasi Beberapa Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim Tripsin

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

1%

2

majalaremaja.blogspot.com

Internet Source

1%

3

semnasbiounand.files.wordpress.com

Internet Source

1%

4

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

1%

6

link.springer.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1%

8

docplayer.info

Internet Source

1%

9

jtp.ub.ac.id

	Internet Source	1%
10	www.ilmudasar.com Internet Source	1%
11	journal.ipb.ac.id Internet Source	1%
12	id.scribd.com Internet Source	1%
13	media.neliti.com Internet Source	1%
14	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
15	www.researchgate.net Internet Source	1%
16	www.damandiri.or.id Internet Source	1%
17	Submitted to University of Sheffield Student Paper	1%
18	e-journal.biologi.lipi.go.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
20	www.coursehero.com Internet Source	<1%

21 prosiding.unipma.ac.id <1%
Internet Source

22 Submitted to Syiah Kuala University <1%
Student Paper

23 T Nurhayati, M Nurilmala, A Nuraini. <1%
"Characterization of Trimethylamin-N-Oxide
Demethylase (TMAOase) of Lizardfish from
Indonesian Waters", IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science, 2019
Publication

24 Submitted to University of Warwick <1%
Student Paper

25 Yati Sudaryati Soeka, Evi Triana. "Pemanfaatan <1%
Limbah Kulit Udang untuk Menghasilkan Enzim
Kitinase dari *Streptomyces macrosporeus*
InaCC A454", Jurnal Kimia Terapan Indonesia,
2016
Publication

26 Submitted to Academic Library Consortium <1%
Student Paper

27 etheses.uin-malang.ac.id <1%
Internet Source

28 eprints.utm.my <1%
Internet Source

29

Internet Source

<1%

30

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1%

31

www.phys.sci.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

32

www.slideshare.net

Internet Source

<1%

33

es.scribd.com

Internet Source

<1%

34

dergipark.org.tr

Internet Source

<1%

35

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

36

www.unisbank.ac.id

Internet Source

<1%

37

digilibunesa.org

Internet Source

<1%

38

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

39

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

J_Karakterisasi Beberapa Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim Tripsin

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
