

Aplikasi Sistem Orthonormal Di Ruang Hilbert Pada Deret Fourier

Fitriana Yuli S.
FMIPA UNY

Abstrak

Ruang hilbert akan dibahas pada paper ini. Aplikasi system orthonormal akan dikaji dan akan diaplikasikan pada ruang Hilbert. Dapat diketahui bahwa himpunan $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ deret klasik fourier adalah bentuk system orthonormal lengkap di ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$. Sebagai akibatnya himpunan τ dari polynomial trygonometri adalah padat di $L_2(-\pi, \pi)$

Kata kunci: Sistem Orthonormal, Ruang Hilbert, Deret Fourier

A. Pendahuluan

Analisis Fourier klasik pada mulanya berkembang dalam upaya mempelajari deret dan integral Fourier. Deret trigonometri yang kita kenal sekarang sebagai *deret Fourier* pertama kali diperkenalkan oleh D. Bernoulli pada tahun 1750 - an, ketika ia mengkaji persamaan diferensial parsial untuk sebuah dawai bergetar. Bernoulli menemukan bahwa untuk $f(x) = \sin(k\pi x/l)$ maka fungsi $u(x, t) = \sin(k\pi x/l) \cos(k\pi t/l)$ merupakan solusi untuk setiap bilangan positif k. Deret fourier klasik $u(x, t)$ akan diaplikasikan sebagai system orthonormal di ruang Hilbert.

B. Pembahasan

Inner Product Di Ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$ didefinisikan bahwa untuk sembarang

$$(u | v) = \int_{-\pi}^{\pi} u(x)v(x)dx \quad , \forall x \in [-\pi, \pi]$$

Sistem Orthonormal di ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$ didefinisikan

Untuk sembarang X Ruang Hilbert atas \mathbb{R} , dan $\{u_0, u_1, \dots\}$ adalah system orthonormal yang dapat dihitung dalam X, yaitu

$$(u_k | u_m) = \delta_{km} \quad \text{untuk semua } k, m$$

Barisan $u(x)$ dalam deret fourier didefinisikan sebagai :

$$u(x) := (2\pi)^{-1/2} \quad , \quad u_{2m-1}(x) := \pi^{-1/2} \cos nx$$

$$u_{2m}(x) := \pi^{-1/2} \sin nx \quad , \quad \text{untuk } m=1,2,3, \dots$$

Preposisi 1.

Himpunan $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ membentuk suatu sistem orthonormal lengkap di ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$.

Pembuktian

Langkah 1

Akan ditunjukkan bahwa u_n merupakan sistem orthonormal yaitu memenuhi

$$(u_n | u_k) = \int_{-\pi}^{\pi} u_n(x) u_k(x) dx = \delta_{nk}.$$

Dalam deret fourier diketahui $u_k := \pi^{-1/2} \sin kx$; $u_n := \pi^{-1/2} \cos nx$

Beberapa kemungkinan nilai $(U_n | U_k)$ yaitu

A. Kemungkinan inner product ke-1 yaitu

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx dx$$

Ada dua kemungkinan untuk nilai n dan k yaitu

1. Nilai n = k

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \sin nx dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\sin (nx - nx) + \sin (nx + nx)] dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\sin 0 + \sin 2nx] dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [0 + \sin 2nx] dx$$

Batas dibagi menjadi 2 yaitu dari $-\pi \leq x \leq 0$ dan $0 \leq x \leq \pi$ karena nilai integralnya sama maka hanya dihitung salah satu kemudian dikalikan 2

$$= 2 x (\pi^{-1} \int_0^{\pi} 1/2 (\sin 2nx) dx)$$

$$= 2 x (\pi^{-1} 1/2 [1/2 (-\cos 2nx)]_0^{\pi})$$

$$= 2 x (\pi^{-1} 1/2 (1/2 (-\cos 2n\pi - (-\cos 0)))$$

$$= 2 x (\pi^{-1} 1/2 (1/2 (-1 - (-1)))$$

$$= 2 x 0$$

$$= 0 = \delta_{nk}$$

2. Nilai $n \neq k$

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\sin (nx - kx) + \sin (nx + kx)] dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\sin (n - k)x + \sin (n + k)x] dx$$

$$= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \sin (n - k)x dx + \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \sin (n + k)x dx$$

$$= 2 x \pi^{-1} \cdot 1/2 \cdot [1/(n - k) - \cos (n - k)x]_0^{\pi} + 2 x \pi^{-1} \cdot 1/2 \cdot [1/(n + k) - \cos (n + k)x]_0^{\pi}$$

$$= 2 x \pi^{-1} \cdot 1/2 \cdot \left[\frac{-\cos (n - k)\pi}{(n - k)} - \left(\frac{-\cos (n - k)0}{n - k} \right) \right] + 2 x \pi^{-1} \cdot 1/2 \cdot \left[\frac{-\cos (n + k)\pi}{(n + k)} - \left(\frac{-\cos (n + k)0}{n + k} \right) \right]$$

$$= 2 x (\pi^{-1} 1/2 (1/2 (-1 - (-1))) + 2 x (\pi^{-1} 1/2 (1/2 (-1 - (-1)))$$

$$= 2 \times 0 + 2 \times 0$$

$$= 0 = \delta_{nk}$$

$$\text{Nilai } (U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx dx = \begin{cases} 0, & n \neq k \\ 0, & n = k \end{cases}$$

B. Kemungkinan inner product ke-2 yaitu

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos kx dx$$

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos kx dx$$

Kemungkinan nilai n dan k yaitu

1. Nilai n=k

$$\begin{aligned} (U_n | U_k) &= \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1} \cos^2 nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1} \cdot \frac{1}{2} [1 + \cos 2nx] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1} dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1} \cos 2nx dx \\ &= \frac{1}{2} \pi^{-1} [x]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2} \pi^{-1} \left[\frac{\sin 2nx}{2n} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \pi^{-1} (\pi - (-\pi)) + \frac{1}{2} \pi^{-1} \left(\frac{\sin 2n\pi}{2n} - \frac{\sin -2n\pi}{2n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \pi^{-1} (2\pi) + \frac{1}{2} \pi^{-1} \left(\frac{\sin 2n\pi}{2n} + \frac{\sin 2n\pi}{2n} \right) \\ &= \pi^{-1} \pi + \frac{1}{2} \pi^{-1} \left(\frac{2 \sin 2n\pi}{2n} \right) \\ &= 1 + 0 = \delta_{nk} \end{aligned}$$

Batas dibagi menjadi 2 yaitu dari $-\pi \leq x \leq 0$ dan $0 \leq x \leq \pi$ karena nilai integralnya sama maka hanya dihitung salah satu kemudian dikalikan 2

$$= 1 + 0 = \delta_{nk}$$

2. Nilai $n \neq k$

$$(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos kx dx$$

$$\begin{aligned}
 (U_n | U_k) &= \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos kx dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos (nx - kx) + \cos (nx + kx)] dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos (n - k)x + \cos (n + k)x] dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cos (n - k)x dx + \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cos (n + k)x dx
 \end{aligned}$$

Batas dibagi menjadi 2 yaitu dari $-\pi \leq x \leq 0$ dan $0 \leq x \leq \pi$ karena nilai integralnya sama maka hanya dihitung salah satu kemudian dikalikan 2

$$\begin{aligned}
 &= 2 \times \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin(n-k)x}{n-k} \right]_0^{\pi} + 2 \times \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin(n+k)x}{n+k} \right]_0^{\pi} \\
 &= 2 \times 0 + 2 \times 0 \\
 &= 0 \quad \delta_{nk}
 \end{aligned}$$

Nilai $(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \cos nx \cdot \pi^{-1/2} \cos kx dx = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$

C. Kemungkinan inner product ke-3 yaitu $(U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \sin nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx dx$

Kemungkinan nilai n dan k

1. Nilai n=k

$$\begin{aligned}
 (U_n | U_k) &= \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \sin nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos (nx - nx) - \cos (nx + nx)] dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos 0 - \cos 2nx] dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cos 0 \, dx - \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2nx \, dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cdot 1 \, dx - \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2nx \, dx
 \end{aligned}$$

Batas dibagi menjadi 2 yaitu dari $-\pi \leq x \leq 0$ dan $0 \leq x \leq \pi$ karena nilai integralnya sama maka hanya dihitung salah satu kemudian dikalikan 2

$$\begin{aligned}
 &= 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 [x]_0^{\pi} - 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin 2nx}{2n} \right]_0^{\pi} \\
 &= 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 [\pi] - 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin 2n\pi}{2n} - \frac{\sin 0}{2n} \right] \\
 &= 1 - 0 = 1 = \delta_{nk}
 \end{aligned}$$

2. Nilai $n \neq k$

$$\begin{aligned}
 (U_n | U_k) &= \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \sin nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx \, dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos (nx - kx) - \cos (nx + kx)] \, dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 [\cos (n-k)x - \cos (n+k)x] \, dx \\
 &= \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cos (n-k)x \, dx - \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} 1/2 \cos (n+k)x \, dx
 \end{aligned}$$

Batas dibagi menjadi 2 yaitu dari $-\pi \leq x \leq 0$ dan $0 \leq x \leq \pi$ karena nilai integralnya sama maka hanya dihitung salah satu kemudian dikalikan 2

$$\begin{aligned}
 &= 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin(n-k)x}{n-k} \right]_0^{\pi} - 2x \pi^{-1} \cdot 1/2 \left[\frac{\sin(n+k)x}{n+k} \right]_0^{\pi} \\
 &= 2x \cdot 0 - 2x \cdot 0 = 0 = \delta_{nk}
 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai } (U_n | U_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \pi^{-1/2} \sin nx \cdot \pi^{-1/2} \sin kx \, dx = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

Terbukti $(U_n | U_k) = \delta_{nk}$ yaitu

- Terbukti bahwa u_n merupakan Sistem Orthonormal

Langkah 2

Dengan menggunakan Corollary 4 yaitu bahwa $r = \text{span}\{u_0, u_1, \dots\}$, barisan

polynomial trygonometri adalah padat di $L_2(-\pi, \pi)$.

Jelas bahwa deret fourier merupakan polynomial trygonometri maka u_n padat di $L_2(-\pi, \pi)$.

Langkah 3

Dengan menggunakan Teorema 3.A yaitu barisan yang merupakan Sistem

Orthonormal di ruang Hilbert X atas K apabila padat di X maka Lengkap di X dan berlaku sebaliknya.

- Terbukti bahwa himpunan $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ deret klasik fourier adalah bentuk sistem orthonormal lengkap di ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$.

Corollary 2.

$\forall u \in L_2(-\pi, \pi)$ deret fourier klasik konvergen di $L_2(-\pi, \pi)$ yaitu

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (u(x) - 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^m a_k \cos kx + b_k \sin kx)^2 dx = 0$$

Bukti

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (u(x) - 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^m a_k \cos kx + b_k \sin kx)^2 dx =$$

$u(x)$ disubstitusi oleh $u(x) = 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$ diperoleh

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} ((2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx) - 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^m a_k \cos kx + b_k \sin kx)^2 dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} ((2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx) - 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx)^2 dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} (0)^2 dx$$

$$=0$$

Terbukti $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (u(x) - 2^{-1}a_0 - \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \sin kx)^2 dx = 0$

Lemma 3

Untuk setiap fungsi $f \in C[-\pi, \pi]$ dengan

$$f(-\pi) = f(\pi), \forall \epsilon \geq 0, \exists \text{ fungsi } p \in \tau \text{ sehingga } \|f - p\|_{C[-\pi, \pi]} < \epsilon$$

BUKTI

Langkah 1

Misal f fungsi genap yaitu $f(-x) = f(x)$. Fungsi ini dipenuhi oleh $\phi(x) := \cos x$ yang merupakan fungsi yang menurun tajam pada interval $[0, \pi]$, $y \rightarrow f(\phi^{-1}(y))$ kontinu pada interval $[-1, 1]$, berdasar teorema Aproksimasi Weirstrass yaitu untuk fungsi kontinu terdapat polynomial $p(y) = c_0 + c_1y + \dots + c_ny^n$ sehingga

$$\max_{-1 \leq y \leq 1} |f(\phi^{-1}(y)) - p(y)| < \epsilon,$$

Oleh karena itu terdapat $p(y) = c_0 + c_1y + \dots + c_ny^n$ dan berlaku

$$\max_{-1 \leq y \leq 1} |f(\phi^{-1}(y)) - p(y)| < \epsilon, \text{ misal } y = \cos x,$$

$$\max_{-1 \leq y \leq 1} |f(\phi^{-1}(\cos x) - p(\cos x))| < \epsilon, \quad q(x) := p(\cos x) \text{ maka diperoleh}$$

$$\max_{0 \leq x \leq \pi} |f(x) - q(x)| < \epsilon,$$

Terbukti untuk f fungsi genap terdapat polynomial q sehingga berlaku

$$\max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - g(x)| < \varepsilon$$

Langkah 2

Misal f fungsi ganjil yaitu $f(-x) = -f(x)$ untuk setiap $x \in [-\pi, \pi]$, nilai

$f(0) = f(\pi) = 0$. Dipilih $\delta > 0$ dan dibentuk

$$g(x) := \begin{cases} f\left(\frac{\pi(x-\delta)}{\pi-2\delta}\right) & \text{jika } 0 < \delta \leq x \leq \pi - \delta \\ 0 & \text{jika } 0 \leq x \leq \delta \text{ atau } \pi - \delta \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Diketahui $g(x) = -g(-x)$ jika $-\pi \leq x \leq 0$. Saat f kontinyu seragam di interval

$[-\pi, \pi]$ berdasar teorema Weierstrass diperoleh $\max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - g(x)| < \varepsilon/2$ untuk nilai

$\delta > 0$ yang cukup kecil.

Saat $x \rightarrow \frac{g(x)}{\sin(x)}$ di $[-\pi, \pi]$ kontinyu di $[-\pi, \pi]$ karena $g(x)$ kontinyu sehingga ada

$q \in \mathbb{R}$ berlaku $\max_{-a \leq x \leq a} \left| \frac{g(x)}{\sin(x)} - q(x) \right| < \varepsilon/2$, misalkan $r(x) := q(x) \sin x$ diperoleh

$$\max_{-a \leq x \leq a} \left| \frac{g(x)}{\sin(x)} - \frac{q(x)}{\sin(x)} \right| < \varepsilon/2$$

$$\max_{-a \leq x \leq a} \left| \frac{1}{\sin x} \right| \cdot |g(x) - q(x)| < \varepsilon/2$$

$$\max_{-a \leq x \leq a} |g(x) - q(x)| < \max_{-a \leq x \leq a} |\sin x| \varepsilon/2$$

$$\max_{-a \leq x \leq a} |g(x) - r(x)| < 1 \cdot \varepsilon/2$$

$$\max_{-a \leq x \leq a} |g(x) - r(x)| < \varepsilon/2 \text{ maka}$$

$$\max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - r(x)| = \max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - g(x) + g(x) - r(x)|$$

$$\leq \max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - g(x)| + \max_{-a \leq x \leq a} |g(x) - r(x)|$$

$$\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2$$

$$\leq \varepsilon$$

Terbukti untuk f fungsi ganjil terdapat $r(x)$ sehingga berlaku

$$\max_{-a \leq x \leq a} |f(x) - r(x)| < \varepsilon$$

Langkah 3

Dalam kasus yang umum, digunakan dekomposisi fungsi yaitu

$$f(x) = 2^{-1}(f(x) + f(-x)) + 2^{-1}(f(x) - f(-x))$$

kemudian diterapkan langkah 1 untuk fungsi genap dan langkah 2 untuk fungsi ganjil dengan menerapkan

Teorema nilai rata-rata Weierstrass dan ketaksamaan segitiga sehingga diperoleh

$$f(x) - f(-x) = 0 \text{ untuk } x \in [0, \pi]$$

Corollary 4

Himpunan r dari polynomial trygonometri adalah padat di $L_2(-\pi, \pi)$

Bukti

Misal $u \in L_2(-\pi, \pi)$ dan misal diberikan $\varepsilon > 0$. Dengan preposisi 7 yaitu

$X := C[a, b]$ dengan $-\infty < a < b < \infty$, himpunan Polynomial

$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ dengan a_i bilangan real adalah padat di X sehingga

untuk u elemen polynomial $p(x)$ dapat diperoleh fungsi kontinu $C[-\pi, \pi]$ yang

padat di $L_2(-\pi, \pi)$ artinya terdapat fungsi kontinu $f: [-\pi, \pi] \rightarrow R$ sehingga

$$\|u - f\| \equiv \left(\int_{-\pi}^{\pi} (u(x) - f(x))^2 dx \right)^{1/2} < \varepsilon$$

Dengan mengganti fungsi kontinu f didekat titik $x = \pi$ dapat diasumsikan bahwa

$f(-\pi) = f(\pi)$ dengan lemma 3 maka terdapat fungsi $g \in r$ sehingga $\|f - g\| \leq \varepsilon$

Sehingga dapat diperoleh

$$\|u - q\| = \|u - f + f - q\|$$

$$\|u - q\| \leq \|u - f\| + \|f - q\|$$

$$\|u - q\| \leq \varepsilon + \varepsilon$$

$$\|u - q\| \leq 2\varepsilon$$

Terbukti r padat di $L_2(-\pi, \pi)$

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa himpunan $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ deret klasik fourier adalah bentuk sistem orthonormal lengkap di ruang Hilbert $L_2(-\pi, \pi)$. Sebagai akibatnya himpunan r dari polynomial trygonometri adalah padat di $L_2(-\pi, \pi)$

DAFTAR PUSTAKA

- Couway, John B., 1990, "A Course in Functional Analysis", 2 ed, Springer-Verlag, New York
- Hendra Gunawan, 2007, "naskah pidato guru besar ITB", FMIPA ITB Bandung

